

Tartamudez en la infancia. Estudio de 30 niños

PELAZ, M.* , GIL VERONA, J.** , PASTOR, J.F.** , COCA, J.M.***

RESUMEN: Son estudiados 30 niños de edades comprendidas entre 6 y 17 años que han sido diagnosticados de disfemia durante los años 1992 a 1994 en la Unidad de Logopedia de la Universidad de Valladolid. Se someten los resultados a los siguientes parámetros: edad, edad de comienzo, edad de Lenguaje, número de hermanos, lugar que ocupa el paciente en la familia, sexo, lateralidad, CI total, verbal y manipulativo, alteraciones logopédicas acompañantes. La evolución ha sido favorable en todos los casos salvo en los pacientes con personalidad obsesiva PALABRAS CLAVE: DISFEMIA, TARTAMUDEZ

STAMMERING IN CHILDHOOD. STUDY OF 30 CHILDREN. (SUMMARY): 30 children between 6 and 17 years old are studied who have been diagnosed of dysphemia during 1992 to 1994 in the Logopaedics Department of the Valladolid University. The results obtained are referred to the following parameters: age, onset age, language age, number of brothers, patient position in the family, sex, laterality, IQ, verbal IQ, performance IQ, companions logopedics disorders. The evolution has been favourable in all the cases except the patients with obsessive personality KEY WORDS: DYSPHEMIA, STAMMERING

INTRODUCCIÓN

Podemos definir la tartamudez o disfemia, según Untoria et al (1), como un trastorno de la fluidez verbal caracterizado por una irregularidad en el ritmo de producción y de emisión de las secuencias verbales. Está compuesta de síntomas característicos que la definen: repetición clónica, bloqueo tónico y alargamiento de fonemas. Se fija en sujetos que no demuestran progresivos daños orgánicos encefálicos o sensoriales, ni en órganos de articulación o de resonancia,

en ausencia además de patología psiquiátrica.

El motivo de este trabajo ha sido la revisión de todos los pacientes diagnosticados de disfemia en la Unidad de Logopedia de la Universidad de Valladolid entre los años 1992 a 1994

POBLACIÓN Y MÉTODOS

El número de pacientes ha sido de 30 y hemos considerado los siguientes parámetros:

* Unidad de Logopedia de la Universidad de Valladolid

** Departamento de Anatomía de la Universidad de Valladolid

*** Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Valladolid

- .-edad de comienzo
- .-sexo
- .-nº de hermanos y lugar que ocupa
- .-edad de lenguaje y edad cronológica
- .-antecedentes familiares de disfemia
- .-lateralidad
- .-C.I, verbal y manipulativo
- .-alteraciones logopedicas acompañantes

RESULTADOS

En relación con otras patologías tratadas en nuestra unidad, en 1992 de los

215 pacientes el 3.72% fueron diagnosticados de disfemia, en 1933 de los 233, el 4.29% y en 1994 de los 224, el 5.34% (fig. 1). Cuando acuden a consulta el 25,5% de los pacientes tienen entre 7 y 7.9 años siendo la edad media de 9.6, siendo la edad media de comienzo de 4.6 años así un 42.85% de los casos tuvo su inicio entre los 3-3.9 años y un 21.42% entre los 4 y 4.9. (fig. 2). En relación con la edad cronológica hemos estudiado la edad de lenguaje en el momento que acuden a consulta encontrando que en el 41.66% de los casos la edad cronológica era




FIG. 1. Número de pacientes atendidos en la Unidad de Logopedia de la Universidad de Valladolid durante los años 1992-1994.




FIG. 2. Edad de los pacientes cuando acuden a consulta y edad de comienzo de la enfermedad.




FIG. 3. Relación existente entre la edad de lenguaje (Línea negra) con la edad cronológica de los pacientes (barras).

mayor que la del lenguaje, en el 4.16% era igual y en el 54.16% menor (fig. 3). Respecto al sexo, el 70% (21/30) de los casos estudiados son varones. En relación a la lateralidad, el 93% de los pacientes es diestro, encontrando un solo caso de zurdo y otro de zurdo contrariado. El número de hijos (incluido el paciente) es de 2 en un 50% y solo el 17.8% tenía 4 hijos o más. Dentro de los

hijos, el 66.6% de los pacientes era el menor de la familia.

Existen antecedentes familiares en un 60% de los casos, el 30% tenía antecedentes paternos, el 26.6% maternos y el 3.3% ambos (fig. 4). Por grado de parentesco, en el caso paterno, el 55.5% de los casos, era el padre el antecedente disfémico, en el caso materno, el 37.5%. En







FIG. 4. Antecedentes familiares de dislexia.

cuanto al CI total, el 72.4% tenía un CI total entre 100 y 129. En los resultados del CI verbal, hemos encontrado que el 28.5% tenía una puntuación entre 110 y 119, en cuanto al CI manipulativo el 31.8% tenía una puntuación entre 100 y 109 y el 27.27% entre 110 y 119 (fig. 5) En relación a las alteraciones logopédicas acompañantes, las más frecuentes son las


alteraciones de la lectura, encontrándose en un 47.36% de las alteraciones descritas (fig. 6).

CONCLUSIONES


1. El comienzo de la enfermedad de los niños se produce en una época cercana al comienzo del lenguaje.



CI: 108.25



CI: 114.76



CI: 108.28

FIG. 5. CI total, manipulativo y verbal de los pacientes diagnosticados de disfemia.




FIG. 6. Alteraciones logopédicas acompañantes.

2. Existe un claro predominio en los varones, lo que coincide con la bibliografía consultada.

3. Entre nuestros pacientes hemos encontrado que el 66.6% eran el pequeño de la familia, lo que no concuerda por lo descrito por otros autores

4. Hemos encontrado antecedentes familiares en un 60% frente al 36% descrito por otros autores, en un gran porcentaje de estos pacientes la disfemia va acompañada de alteraciones de la lectura.

5. Aunque el diagnóstico del número de pacientes tratados de disfemia ha ido en aumento en los últimos años, esta patología representa un pequeño porcentaje de las alteraciones logopédicas tratadas

BIBLIOGRAFÍA

1. UNTORIA, M.C.; GARCÍA, M.J.; GARCÍA, E.L.: "Disfemia en la infancia". *Revista Española de Foniatría*, 1989, vol. 2, nº 1: 15-19.

Petición de separatas:

JOSÉ ANTONIO GIL VERONA
Dpto. de Anatomía
Facultad de Medicina
C /Ramón y Cajal, 7
47005 VALLADOLID