

## PAUTA DIAGNOSTICO - TERAPEUTICA

### Convulsiones febriles

J. L. HERRANZ FERNÁNDEZ

#### CONVULSIONES FEBRILES - DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

Son crisis tónicas, clónicas o tónico-clónicas, que afectan a niños de 3 meses a 7 años de edad, especialmente entre los 12 meses y los 3 años de edad, en ausencia de infecciones intracraneales, producidas por exacerbación de una predisposición convulsiva constitucional.

#### TRATAMIENTO DE LA CONVULSIÓN FEBRIL AGUDA

*Cuanto está presente el médico* —en el domicilio del paciente o en la Unidad de Urgencias— administración intravenosa muy lenta de clonacepam (Rivotril<sup>R</sup> 1 ampolla = 1 mg.) a razón de 1 mg. en niños menores de 3 años, o de 2 mg. en niños mayores de 3 años, aunque se debe interrumpir la inyección si cesa la crisis convulsiva con menos cantidad de fármaco; o bien, administración intravenosa muy lenta de Diacepam (Valium<sup>R</sup> 1 ampolla = 10 mg.), hasta 5-7,5 mg. en niños menores de 3 años, y hasta 7,5-10 mg. en niños mayores de 3 años. Si fracasan estos fármacos, inyección intravenosa muy lenta de Difenilhidantoína (Fenitoina<sup>R</sup> 1 vial = 250 mg.) a razón de 18-20 mg./kg. a cualquier

edad. Si también fracasa este fármaco, anestesia y respiración asistida en una Unidad de Cuidados Intensivos.

*En ausencia del médico*, en el medio familiar, administración de diacepam (Valium<sup>R</sup>) por vía rectal, de 1/2 a 1 ampolla (5-10 mg.) sin diluir, según la edad, repitiendo esa misma dosis si persisten las manifestaciones convulsivas después de 1-2 minutos.

#### OBSERVACIÓN HOSPITALARIA RECOMENDABLE

1. Mal estado general del niño.
2. Convulsión febril compleja, esto es, prolongada (duración superior a 15 minutos de la manifestación convulsiva), focal, o recidivante dentro del mismo proceso infeccioso febril.
3. Cuando se indica la práctica de una punción lumbar.

#### PAUTA DIAGNÓSTICA

La *exploración clínica* es la única valoración necesaria en los niños con convulsiones febriles, prestando especial atención a signos neurológicos focales y a los signos que orienten hacia la etiología de la fiebre.

En algunas ocasiones, especialmente en niños menores de 18 meses de edad, pueden estar justificadas otras exploraciones complementarias:

1. *Hemograma*, orientador del origen vírico o bacteriano de la infección.
2. *Natremia* para descartar la secreción inapropiada de ADH (hiponatremia), especialmente en las recidivas de las convulsiones febriles dentro del mismo proceso infeccioso febril.
3. *Punción lumbar* y estudio del LCR —proteínas, glucosa, células, cultivo— siempre que un pediatra experimentado lo considere oportuno. En tal caso debe explorarse previamente el FONDO DE OJO, para descartar la existencia de hipertensión intracraneal (edema de papila).
4. *Glucemia* para comparar con la glucorraquia, en su caso.

#### TRATAMIENTO PROFILÁCTICO

Su objetivo es evitar recidivas de las convulsiones febriles y secuelas neuropsíquicas de las mismas. Se considera indicado en niños con:

1. Convulsiones febriles complejas.
2. Convulsiones febriles simples (o complejas), pero con:
  - edad inferior a los 12 meses,
  - 3 ó más convulsiones febriles,
  - patología durante el período neonatal,
  - retraso motor o mental,
  - patología en la exploración neurológica,
  - epilepsia en padres o hermanos, o
  - ansiedad familiar grave.

Hay dos posibilidades de tratamiento profiláctico:

#### I. TRATAMIENTO PROFILÁCTICO DISCONTINUO

Administración de diacepam (Valium<sup>R</sup>) por vía rectal, a razón de 5-7,5

mg. (1/2 a 3/4 de ampolla) en niños menores de 3 años, o de 7,5-10 mg. (3/4 a 1 ampolla) en mayores de 3 años, cuando se detecta fiebre superior a 38 grados, repitiendo esas dosis cada 8 horas si persiste la fiebre.

#### II. TRATAMIENTO PROFILÁCTICO CONTINUO DIARIO

Puede efectuarse con uno de los tres fármacos siguientes:

1. *Fenobarbital* (Luminal<sup>R</sup> 100 mg., Luminaletas<sup>R</sup> 15 mg.) con dosis paulatinamente crecientes hasta llegar a una dosis de 5-7 mg./kg./día, en toma única nocturna, coincidiendo con la cena, para alcanzar un nivel sérico de fenobarbital de 20-30 ug./ml.

2. *Primidona* (Mysoline<sup>R</sup> 250 mg.) con dosis paulatinamente crecientes hasta llegar a una dosis de 18-20 mg./kg./día, repartida en 2 tomas al día, en desayuno y cena, para alcanzar un nivel sérico como fenobarbital de 20-30 ug./ml.

3. *Valproato sódico* (Depakine<sup>R</sup> solución, grageas de 200 mg., grageas de 500 mg.) con dosis paulatinamente crecientes hasta llegar a una dosis de 30-40 mg./kg./día, repartida en 2 tomas al día, en desayuno y cena, para alcanzar un nivel sérico de 50-100 µg./ml. de valproato sódico en la muestra extraída antes de la toma de la mañana, aproximadamente 12 horas después de la toma de Depakine de la noche previa.

Cualquiera de estos fármacos debe mantenerse hasta los 4-5 años de edad, de acuerdo con la edad de comienzo del tratamiento y con la frecuencia de infecciones febriles del niño, realizando durante esos años controles periódicos clínicos y de los niveles plasmáticos, para asegurar la eficacia y el cumplimiento terapéutico, y para evitar los efectos secundarios.

## BIBLIOGRAFIA

- HERRANZ, J.L.: *Convulsiones febriles*. An. Esp. Pediatr. 1986, 24, 119-123.
- HERRANZ, J.L.; ARMJO, J.A.; ARTEAGA, R.: *Effectiveness and toxicity of phenobarbital, primidone and sodium valproate in the prevention of febrile convulsions, controlled by plasma levels*. Epilepsia 1984, 25, 89-95.
- KNUDSEN, F.U.: *Effective short-term diazepam, prophylaxis in febrile convulsions*. J. Pediatr. 1985, 106, 487-490.
- NELSON, K.B.; ELLENBERG J.H.: *Febrile seizures*. Raven Press, New York, 1981.
- OLIETE, F.; CAMPOS, J.; CAREAGA, J.: *Fenobarbital oral continuado o diazepam rectal intermitente para la prevención de las convulsiones febriles*. An. Esp. Pediatr. 1984, 20, 763-769.